




Dentes Inclusos

O que são os dentes inclusos?

São dentes que não conseguem erupcionar (nascer) e ocupar sua posição na arcada dentária dentro do tempo esperado. Os mais comuns são os dentes do siso. Eles representam os últimos dentes da arcada. São chamados de terceiros molares. Existem quatro dentes do siso: dois superiores e dois inferiores. Eles iniciam sua formação aproximadamente aos 12 anos de idade e erupcionam normalmente entre 16 e 20 anos, chamada época do juízo.

Terceiros Molares Inclusos em contato com as raízes dos Segundos Molares





Por que às vezes eles não erupcionam?

Algumas pessoas podem simplesmente não ter a formação de um ou mais dentes do siso. Porém, na maioria das vezes em que eles estão presentes, a falta de espaço nas arcadas impede a sua erupção. É quando são chamados de impactados.

Qual a melhor idade para remover os sisos?

Entre 14 e 17 anos, quando o siso ainda não está completamente formado e apresenta-se em uma posição mais favorável para sua remoção. Com a formação completa do siso, a cirurgia e a recuperação pós-operatória ficam mais complicadas, pois as chances das raízes estarem próximas ao nervo e outras estruturas aumentam, além do osso se tornar mais denso. Esperar que o dente se torne sintomático para só então procurar o atendimento não é a conduta indicada. A recomendação é procurar um especialista em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, que é o profissional capacitado para avaliar a época ideal e a conduta para cada caso. Se a conduta for não extrair o dente, o paciente deve ser avaliado anualmente com radiografias dos sisos para assegurar a manutenção da saúde dos dentes e dos tecidos moles.



Terceiros Molares
(dentes do siso)

Há algum risco em não se remover os sisos?

Sim. O siso pode causar reabsorção ou cárie nos dentes vizinhos, dor e possíveis degenerações como cistos e tumores. Além disso, a força de erupção dos dentes sisos pode levar ao desalinhamento dos dentes na arcada dentária e gerar problemas ortodônticos. O paciente pode sentir dor e pressão assim que o dente tenta erupcionar.

O que acontece se ele erupcionar parcialmente?

Esse quadro pode provocar inflamação da gengiva ao redor do dente, denominada pericoronarite, abscessos na região, irritação local, dor, edema e limitação da abertura de boca

O que fazer quando a gengiva do siso que está erupcionando inflama?

O processo inflamatório e/ou infeccioso na gengiva que recobre o terceiro molar é chamado pericoronarite e deve ser avaliado com rigor por um cirurgião buco-maxilo-facial. Algumas vezes pode ser bastante grave. Após o tratamento inicial (limpeza, irrigações, medicamentos), o procedimento cirúrgico para retirada dos terceiros molares deverá ser realizado.

Inflamação gengival causada por um Dente Incluso



Devo extrair todos os dentes do siso ou somente aquele que está incomodando?

Via de regra todos os terceiros molares inclusos devem ser removidos, principalmente com o objetivo de evitar complicações em médio e longo prazo. Em situações específicas, onde os riscos da cirurgia são maiores que os benefícios, seu cirurgião pode optar apenas pelo acompanhamento.